

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE : 24 numéros par an

ÉDITION de la STATION de BORDEAUX (Tél. 92-26-94)

(GIRONDE, DORDOGNE, LOT-&-GARONNE, LANDES,
BASSES-PYRÉNÉES, CHARENTE, CHARENTE-MARITIME)

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux, Chemin d'Artigues, CENON (Gironde)

C. C. P. : BORDEAUX 6707-65

ABONNEMENT ANNUEL
12 NF

DLP 78-2-63 185055

Supplément N° 2 au Bulletin Technique N° 8 de Mai 1961

AVERTISSEMENTS

VIGNE

Mildiou : Les foyers de Mildiou n'ont pas sensiblement évolué depuis le début du mois. Les risques d'invasion restent peu importants dans l'ensemble.

Cependant, en raison de la végétation qui redevient active, il serait utile de prévoir l'application d'un deuxième traitement dès réception de cette note.

Black-Rot : Le traitement conseillé ci-dessus sera également valable contre le Black-Rot.

INFORMATIONS

Oïdium : L'Oïdium est en progrès. Un traitement pourrait être appliqué, de préférence en poudrage à l'approche de la floraison.

AVERTISSEMENTS

ARBRES FRUITIERS

Tavelures des Poiriers et des Pommiers : A la suite des pluies des mois d'Avril et du début de Mai, des attaques parfois importantes ont pu être observées dans quelques vergers. Dans l'ensemble, les apparitions de taches sont très faibles.

Pour éviter des atteintes sur fruits nous conseillons un nouveau traitement dès à présent.

INFORMATIONS

Hoplocampes des Pommes : Quelques abonnés nous signalent la découverte de fruits attaqués par un ver. Nous signalons qu'il ne faut pas confondre ces dégâts avec ceux du Carpocapse qui évolue plus tardivement.

Nous serions reconnaissants aux abonnés qui pourraient nous signaler l'existence de dégâts d'Hoplocampes, leur importance et les variétés atteintes.

POMME de TERRE

Mildiou et Doryphore : Renouveler le traitement préconisé dans notre dernier Bulletin contre le Mildiou.

Dans les cultures où les larves de Doryphore ont atteint la grosseur d'un grain de blé, on adjoindra un insecticide à la Bouillie.

DIVERS

Bombyx disparate : En Dordogne (Régions de Terrasson et de Sarlat), on signale une forte pullulation de Chenilles sur les Chênes. Les dégâts intéressent aussi parfois les Arbres fruitiers, les Noyers et certains feuillus situés à proximité.

Pour enrayer les dégâts, on pourra appliquer une Bouillie contenant de l'Arséniate de Plomb, du D.D.T. ou du Parathion.

Le Contrôleur chargé des Avertissements :
C. ROUSSEL

Bordeaux, le 23 Mai 1961
L'Inspecteur de la Protection des Végétaux
J. BRUNETEAU

.../...

P16

LES SERVICES D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS (Directions de MARMANDE LA REOLE et PERIGUEUX) communiquent :

Le Mildiou a fait son apparition dans les communes suivantes :

- Gironde, PUYBARBAN (deux semis), COURS-LES-BAINS, CASTILLON-DE-CASTETS.
- Landes , PECORADE.
- Lot et Garonne , ST-GEORGES, FUGAROLLES, BRAX, TONNEINS, ST-HILAIRE-SUR-GARONNE, AIGUILLON, FONGRAVE, FAUGUEROLLES, ROUMAGNE, FOURQUES, MARMANDE, BOURRAN, ST-PARDOUX-DU-BREUIL, LE MAS D'AGENAIS et LAGRUERE.
- Dordogne, DOUZILLAC.

En présence de telles attaques et eu égard aux circonstances climatiques actuelles favorables au développement du champignon, il est nécessaire de rappeler à tous les planteurs de traiter très soigneusement leurs semis, d'être vigilants et de suivre scrupuleusement les instructions suivantes :

1°) Le transport des plants malades et la visite des semis contaminés sont formellement interdits à toute personne étrangère au S.E.I.T.A., aux Services Agricoles et au Service de la Protection des Végétaux.

2°) Les semis atteints de Mildiou, même partiellement seront compostés avec de la chaux vive, puis enfouis profondément sur place (15 cms au moins).

3°) La transplantation doit être activée le plus possible.

4°) Les traitements doivent être effectués avec le plus grand soin et répétés après une pluie. Un traitement au Dithane Z 78 est notamment nécessaire avant le repiquage.

a) Avant le prélèvement, on effectuera une pulvérisation sur la face supérieure des feuilles.

b) Après le prélèvement, on alignera sur le sol les plants de chaque paquet. On effectuera une pulvérisation, on retournera les plants pour appliquer une deuxième pulvérisation.

5°) Aucune repousse ne sera admise sur les emplacements de semis .
Aucun semis abandonné après repiquage ne sera toléré.

6 °) Redoubler d'attention dans la surveillance des semis et des plantations.